

Ekosystemhälsoindex

Gårdsnamn:

Datum:

Fältnamn					
Punkt (nummer eller namn)					
Latitud					
Longitud					
Användningstyp (ÖB/PB/ÖV/DV)					
Användningsintensitet (E/L/M/I)					
1. Grönmassa/Levande biomassa					
2. Smådjur					
3. Gräs					
4. Örter och baljväxter					
5. Träd och buskar					
6. Kontextuellt önskade arter					
7. Kontextuellt oönskade arter					
8. Förna mängd					
9. Förna nedbrytning					
10. Gödsel nedbrytning					
11. Bar jord					
12. Skorpa / mossor					
13. Vinderosion					
14. Vattenerosion					
TOTAL					
MAXPOÄNG					
MINPOÄNG					
Kommentarer					
Foto över platsen					
45 graders foto					

Ekosystemhälsoindex

Gårdsnamn:


Datum:

Fältnamn					
Punkt (nummer eller namn)					
Latitud					
Longitud					
Användningstyp (ÖB/PB/ÖV/DV)					
Användningsintensitet (E/L/M/I)					
1. Grönmassa/Levande biomassa					
2. Smådjur					
3. Gräs					
4. Örter och baljväxter					
5. Träd och buskar					
6. Kontextuellt önskade arter					
7. Kontextuellt oönskade arter					
8. Förna mängd					
9. Förna nedbrytning					
10. Gödsel nedbrytning					
11. Bar jord					
12. Skorpa / mossor					
13. Vinderosion					
14. Vattenerosion					
TOTAL					
MAXPOÄNG					
MINPOÄNG					
Kommentarer					
Foto över platsen					
45 graders foto					

Nr	Indikator	Mått	Poäng	Poängsättning baseras på avvikelse från den referensgård i ekoregionen som gården befinner sig i				
1	Levande biomassa	% av potentiell mängd	-10 till 10	>80 % av potential baserat på årsmån, tid på året och tid sen bete. Max fotosyntes.	60-80 % av potential baserat på årsmån, tid på året och tid sen bete.	40-60 % av potential baserat på årsmån, tid på året och tid sen bete.	20-40 % av potential baserat på årsmån, tid på året och tid sen bete.	<20 % av potential baserat på årsmån, tid på året och tid sen bete. Minimal fotosyntes.
				10	5	0	-5	-10
2	Smådjur	Synliga eller spår av	-10 till 10	Riklig förekomst. Lätta att finna.	Något lägre förekomst än platsens potential	Måttligt lägre förekomst. Vissa komponenter saknas.	Betydligt lägre förekomst än platsens potential.	Nästan noll förekomst.
				10	5	0	-5	-10
3	FG gräs	Vigör och reproduktion hos nyckelarter	-10 till 10	Poängsättning enligt separat flödesschema				
4	FG örter och baljväxter	Vigör och reproduktion hos nyckelarter	-10 till 10	Poängsättning enligt separat flödesschema				
5	FG träd och buskar	Vigör och reproduktion hos nyckelarter	-10 till 10	Poängsättning enligt separat flödesschema				
6	Kontextuellt önskade arter	Frekvens	-10 till 10	Frekvens max av potential för årsmån, tid och plats.	Frekvens något lägre än potential för årsmån, tid och plats.	Låg frekvens, svåra att hitta. Alternativt, finns endast i skyddade områden.		
				10	5	0		
7	Kontextuellt oönskade arter	Frekvens och reproduktion	-10 till 10	Saknas eller låg förekomst.			Hög förekomst.	Mycket hög förekomst. Dominant eller co-dominant på platsen.
				0			-5	-10

Nr	Indikator	Mått	Poäng	Poängsättning baseras på avvikelse från den referensgård i ekoregionen som gården befinner sig i				
8	Förna mängd	Täckningsgrad och mängd	0 till 10	Förväntad omfattning baserat på platsens potential och årsmån.	Något mer eller mindre jmf med platsens potential och årsmån.	Mycket lite eller frånvarande, alt. mycket stor förekomst för platsen.		
				10	5	0		
9	Förna nedbrytning	Markkontakt	0 till 10	God kontakt med yttlig jord. Komposterande.	En del komposterande, övrigt oxiderande.	Ingen/liten kontakt med jordytan. Oxiderande.		
				10	5	0		
10	Gödsel nedbrytning	Struktur	0 till 10	Snabb nedbrytning. Försumbar förekomst av gödsel från tidigare år. Hög insektsaktivitet.	Långsammare nedbr. Viss förekomst av gammal gödsel. Måttlig insektsaktivitet.	Gott om vit, mummifierad gödsel. Långsam nedbrytning. Låg insektsaktivitet.		
				10	5	0		
11	Bar jord	% bar jord	-20 till 20	Förväntad mängd och storlek av bara fläckar. <5 %	Lite till måttligt mer än förväntat. 5-10 %	Måttligt mer än förväntat. Måttligt stora fläckar, sporadiskt kopplade. 10-20 %	Måttligt till mycket mer än förväntat. Stora fläckar, ibland kopplade. 20 -25 %	Mycket mer än förväntat. Stora fläckar, ofta kopplade. >25 %
				20	10	0	-10	-20
12	Skorpa / moss	Mekaniskt motstånd/ täckningsgrad moss	-10 till 0	Mjuk jordyta som kan brytas lätt med fingret./ Ingen till liten förekomst av moss.			Tydlig skorpa, bryts med hårt fingertryck / Relativt hög förekomst av moss.	Kraftig skorpa, bryts med metallföremål / Hög förekomst av moss.
				0			-5	-10
13	Vinderosion	Bortblåsning, deposition, piedestaler	-20 till 0	Stabil jord, inga eller enstaka tecken på erosion.			Många punkter med tecken på erosion, men ej sammanbundna.	Omfattande, sammanhängande erosion.
				0			-10	-20
14	Vatten-erosion	Tecken på jord- och förnarörelse, rännilspår, ravinbildning	-20 till 0	Stabil jord, inga eller enstaka tecken på erosion, naturligt stabila vattenflöden med vegetation längs kanten.			Många punkter med tecken på erosion, men ej sammanbundna.	Omfattande, sammanhängande erosion.
				0			-10	-20

Flödesschema funktionella grupper



Nyckelarter olika ekoregioner

	Kontinental	Nemoral	Boreal
Gräs	Timotej Ängssvingel Hundäxing Ängsgröe Rödsvingel Rörflen	Timotej Ängssvingel Hundäxing Ängsgröe Rödsvingel Rörflen	Timotej Ängssvingel Hundäxing Ängsgröe Rödsvingel Rörflen Rajgräs
Örter och baljväxter	Rödklöver Vitklöver Käringtand Svartkämpar Lusern Cikoria	Rödklöver Vitklöver Käringtand Svartkämpar	Rödklöver Vitklöver
Träd och buskar	Ek Hassel Fruktträd Bärbuskar Ask Alm Lind	Ek Hassel Fruktträd Bärbuskar Ask Alm Lind	Björk Rönn Sälg Asp Hägg
Kontextuellt önskade arter	Timotej Rödklöver Svartkämpar Lusern Cikoria	Timotej Rödklöver Svartkämpar	Timotej Rödklöver
Kontextuellt oönskade arter	Skräppa Tistel Smörblomma Nässla Örnbräken Veketåg Tuvtåtel Björnbär Gran En Al	Skräppa Tistel Smörblomma Nässla Örnbräken Veketåg Tuvtåtel Björnbär Gran En Al	Skräppa Tistel Stagg Nässla Vide En Tuvtåtel Al